

## Neueingeführte Spezialitäten

**Duspatal®-Suspension** – Eine neue, flüssige Darreichungsform von Mebeverin, Duspatal®-Suspension, in einem selektiven, muskultropen Spasmolytikum, für die Behandlung von funktionellen Bauchschmerzen im Kindesalter hat Duphar, Hannover, eingeführt. Das Präparat wirkt durch einen direkten und ausgeprägten Effekt auf die glatte Muskulatur des Verdauungstraktes, wobei besonders die gesteigerte Motilität von Ileum und Kolon behoben, dabei jedoch die normale Peristaltik nicht wesentlich beeinflusst wird. hz

**Hypertussin-S und -K** – An Stelle der Pertussin®-Zäpfchen, die aufgrund der Verfügung des Bundesgesundheitsamtes seit Juli nicht mehr im Handel sind, hat Taeschner, Kipfenberg, zur Behandlung fieberhafter Erkrankungen mit Husten im Säuglings- und Kleinkindalter Hypertussin-Zäpfchen in den Formen „S“ (für Säuglinge) und „K“ (für Kleinkinder) auf den Markt gebracht mit den Wirkstoffen Paracetamol und Codein. wa

**Relefact® TRH nasal** – Als Ergänzung des Schilddrüsendiagnostik-Programms mit Relefact® TRH 200 und 400 stellt Hoechst seit Juli Relefact® TRH nasal zur Verfügung. Die klinische Prüfung hat gezeigt, daß diese Zubereitungsform in der Schilddrüsendiagnostik mit derselben Zuverlässigkeit verwendet werden kann wie intravenös zu injizierendes Protirelin. Die Anwendung ist einfach und kann auch durch medizinisches Hilfspersonal vorgenommen werden. Der Anstieg der Thyreotropinkonzentration im Serum nach Relefact® TRH nasal erreicht sein Maximum nach dreißig Minuten und

bleibt bis zu zwei Stunden signifikant erhöht. Dies gestattet einen ebenso raschen Testablauf wie bei intravenöser Stimulation und erlaubt für die zweite Blutabnahme einen genügend großen Spielraum. Die Nebenwirkungsrate ist geringer als nach intrave-

nöser Injektion von Protirelin, besonders dann, wenn der Patient ein leichtes Frühstück eingenommen hat. sc

**Ratiopharm** – Einige seit Jahren bewährte Therapeutika werden jetzt auch von ratiopharm, Blaubeu-

ren, angeboten: MCP-ratiopharm® Injektionslösung, Furosemid-ratiopharm® Injektionslösung, Triamteren comp.-ratiopharm® Filmtabletten, Theophyllin retard-ratiopharm® 125/250 und ISDN-ratiopharm® Retardkapseln in den Dosierungen 20, 40 und 60 mg. et

## SCENEN AUS DER PRAXIS NR. 6



# LESEZIRKEL. DIE ERFOLGREICHE WARTEZIMMER- THERAPIE.

**Indikation:** Morbus Langeweile. Nervöses Warten. Unruhiges Stühlerücken. **Kontraindikation:** keine. **Zusammensetzung:** Unterhaltung, Information, Lebenshilfe. **Dosierung:** 1 x wöchentlich.

**Lesezirkel**  
**Muß ist Medizin**