


30 Jahre NATO

Vor 30 Jahren, am 5. Mai 1955, trat die Bundesrepublik Deutschland dem Bündnis bei, das bereits 1949 von Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und den USA abgeschlossen wurde: der NATO (North Atlantic Treaty Organization), der multilateralen Defensivallianz. Das Abkommen entsprang der Überlegung, der als Bedrohung empfundenen militärischen Präsenz der Sowjetunion in Mitteleuropa als Gegengewicht ein kampffähiges Streitkräftepotential entgegenzusetzen. Der politische Weg zum 5. Mai 1955 war jedoch begleitet von der heftigen Kontroverse über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. 30 Jahre später ist diese Kontroverse wieder aufgebrochen: „Raus aus der Block-Logik“, „Austritt aus der NATO“, „Defensiv bewaffnete Neutralität“ heißen diesmal die Reizworte. Diese Parallelität der 50er und 80er Jahre soll in einer Dokumentation am 6. Mai um 21.15 Uhr in der ARD dargestellt werden; in Interviews nehmen die ehemaligen Bundeswehrgenerale Bastian und Schmücker sowie der SPD-Vorsitzende Willy Brandt und Bundeskanzler Helmut Kohl Stellung.

Wann fängt's denn an?

„Well, it's great here – but when does it start?“ soll der amerikanische Komiker Groucho Marx bei einem Cricket-Länderspiel gesagt haben, als man ihn nach anderthalb Stunden Spiel fragte, wie es ihm ge-



Der „batsman“ verteidigt mit dem Schlagholz („bat“) das Mal („wicket“). Gelingt es der Gegenpartei, mit dem Ball die lose auf dem Mal liegenden Querhölzer herunterzuschleifen, so ist der „batsman“ aus dem Spiel. Eine der anderen Möglichkeiten ist, daß der auch zur Gegenpartei gehörende „wicket keeper“ (rechts) den Ball auffängt
Foto: Sport and General

fiele. Für Ausländer ist Cricket eben kaum zu begreifen – um so bewundernswerter der Versuch von Hartmut Stein, im „Sport-Spiegel“ (ZDF, 3. Mai, 21.15 Uhr) einmal die Faszination dieses Sports in den englischsprachigen Ländern zu erklären.

Gesundheitsthemen

Wissenschaft und Forschung heute. Industriewelt im Umbruch. Gentechnologie. Eine Gesprächsreihe mit Wolfram Huncke und Peter Rost. **Drittes Fernsehen Südwest, 3. Mai, 20.15 Uhr.**

Ein-Blick. Die unsichtbare Krankheit. Tagebuch einer Depression. Die Journalistin Ursula Goldmann-Posch beschreibt ihre Leidenserfahrung. Film von Ursula Königer. **ZDF, 5. Mai, 16.20 Uhr**

Raucher helfen Rauchern. Entwöhnung durch Selbsthilfe. **Drittes Fernsehen Südwest, 6. Mai, 20.20 Uhr**

Jetzt:

Dilzem® retard

1 Retardtablette = 90 mg
(2x täglich)

Dilzem®

1 Tablette = 60 mg
(3x täglich)

Hochwirksam
und nebenwirkungsarm
bei allen Formen der
Angina pectoris

Zusammensetzung: Dilzem[®]: Eine Tablette enthält 60 mg Diltiazemhydrochlorid. Dilzem[®] retard: Eine Retardtablette enthält 90 mg Diltiazemhydrochlorid.
Anwendungsgebiete: Dauerbehandlung der koronaren Herzkrankheit: Anfallsprophylaxe bei chronischer Koronarinsuffizienz oder Angina pectoris, vasospastischer Angina (Prinzmetal-Angina), Angina pectoris bei Zustand nach Herzinfarkt. Dauerbehandlung der arteriellen Hypertonie. **Gegenanzeigen:** Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Frauen im gebärfähigen Alter soll vor einer Behandlung mit Dilzem bzw. Dilzem retard eine mögliche Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Kardiogener Schock, komplizierter frischer Herzinfarkt, dekompensierte Herzinsuffizienz, Sinusknoten-Syndrom, Überleitungsstörungen (sinuatrialer oder atrioventrikulärer Block II. und III. Grades, mit Ausnahme von Patienten mit Herzschrittmachern) sowie Bradykardie (Puls unter 55 Schläge pro Minute). Hinweis: Bei Patienten mit leichten Erregungsleitungsstörungen (AV-Block I. Grades) oder mit niedrigem Blutdruck (unter 90 mmHg systolisch) ist bei der Behandlung mit Dilzem bzw. Dilzem retard Vorsicht geboten. Nicht auszuschließen ist, daß es bei Vorliegen eines WPW-Syndroms mit gleichzeitigem Vorhofflimmern bzw. -flattern unter der Behandlung mit Dilzem bzw. Dilzem retard zu einer Beschleunigung der Kammerfrequenz (Kammertachykardie) kommt. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Juckreiz mit oder ohne Hautausschlag. Im höheren Dosisbereich kann es zu Knöchel- bzw. Beinödemen kommen. In sehr seltenen Fällen wurde ein leichter Anstieg der Serumenzyme SGOT, SGPT, γ-GT und LDH beobachtet. Bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen empfiehlt es sich daher, die Leberfunktion zu kontrollieren. In Einzelfällen, besonders im höheren Dosisbereich und/oder bei entsprechender Vorschädigung des Herzens, kann es zu Bradykardie, AV-Blockierung oder Hypertonie kommen. Die Behandlung des Bluthochdrucks auch mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatwechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. **Hinweise:** Bei gleichzeitiger Gabe von Dilzem bzw. Dilzem retard und Antihypertonika kann es zu einer verstärkten blutdrucksenkenden Wirkung kommen. Bei gleichzeitiger Gabe von Arzneimitteln, die dämpfend auf die Herzfunktion (kardiodepressiv) wirken und/oder die Erregungsleitung im Herzen (AV-Überleitung) hemmen, kann es zu einer Wirkungsverstärkung kommen. Auf diesen additiven Effekt ist besonders bei i.v. Gabe von β-Blockern zu achten. Bei kombinierter Gabe von Digoxin und Diltiazem wurde ein Anstieg des Digoxinplasmaspiegels beobachtet, ohne daß die renale Clearance von Digoxin beeinflusst wurde. Wegen der zumeist minimalen Veränderung ist die klinische Relevanz gering. **Handelsformen und Preise:** Dilzem: Packung mit 30 Tabletten (N1) DM 22,05. Packung mit 50 Tabletten (N2) DM 33,25. Packung mit 100 Tabletten (N3) DM 60,90. Anstaltspackung. Dilzem retard: Packung mit 30 Retardtabletten (N1) DM 36,10. Packung mit 50 Retardtabletten (N2) DM 54,70. Packung mit 100 Retardtabletten (N3) DM 100,-. Anstaltspackung. Alle Preise mit MwSt. Stand: März 1985 G 703/0

GODECKE
Gödecke AG · 1000 Berlin 10