

Philosophische Ferienseminare in der Toscana – Zwei Ferienseminare für philosophisch Interessierte veranstaltet auch in diesem Jahr Dr. Volker Spierling vom Seminar für Philosophie, Tübingen, in Loro Ciuffenna, einer kleinen toscanischen Stadt in der Nähe von Florenz. Das erste Seminar vom 6. bis zum 13. Juni (Pfingsten) ist eine Einführung zum Thema „Arthur Schopenhauer: Metaphysik der Sitten“, das zweite vom 14. bis zum 21. Juni (zwei Feiertage) steht unter dem Thema „Lust an der Erkenntnis: Die Philosophie des 20. Jahrhunderts“. Weitere Informationen bei: Dr. Volker Spierling, Obere Heulandsteige 18, 74 Tübingen, Telefon 0 70 71/2 66 02. rom



Aktionskünstler Ben Wargin (rechts) ist bereits geübter Ginkgo-Pflanzer: hier für die Europa-Natur-Denk-Trasse auf dem Teufelsberg, einem Trümmerberg des Zweiten Weltkriegs in Berlin – so wie in diesen Tagen Ende April in Wiesbaden beim Internistenkongreß
Foto: Dr. Willmar Schwabe, Arzneimittel

Zwei Ginkgo-Bäume für Wiesbaden – Anlässlich der 93. Tagung der deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden wird am 29. April, etwa zur Erscheinungszeit dieses Heftes, der Berliner Aktionskünstler Ben Wargin zwei Ginkgo-Bäume in der hessischen Landeshauptstadt pflanzen. Die Patenschaft für diese Bäume sollen Kongreß-Teilnehmer übernehmen, so die Idee der Firma Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel, Karlsruhe.

Die beiden „Patenkinder“ werden in unmittelbarer Nachbarschaft der Wiesbadener Rhein-Main-Halle hoffentlich gut gedeihen; davon können sich künftig die Besucher und Gäste des Internistenkongresses alljährlich überzeugen. ch

0/0
Neu:

dura- coron

Angina pectoris: Molsidomin

duracoron[®] 1, duracoron[®] 2, duracoron[®] 4: Zus.: 1 Tbl. enth. 1 mg bzw. 2 mg bzw. 4 mg Molsidomin. **Anwend.:** Stabile u. instabile Angina pectoris bei gleichzeitig bestehender Linksherzinsuffizienz. Angina pectoris im akuten Stadium d. Herzinfarktes (nach Kreislaufstabilisierung). Angina pectoris, wenn andere Arzneimittel nicht angezeigt sind, nicht vertragen wurden od. nicht ausreichend wirksam waren, sowie bei älteren Patienten. **Gegenanz.:** Herz-Kreislauf-Schock u. schwere Hypotonie, akuter Herzinfarkt u. akute Linksherzinsuffizienz mit niedrigen Füllungsdrücken. Bei frischem Herzinfarkt duracoron[®] 1/2/4 nur unter kontinuierlicher Kontrolle der Kreislaufverhältnisse anwenden. In der Schwangerschaft nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes anwenden. **Nebenw.:** Selten Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Herzklopfen, Müdigkeit u. Schlaflosigkeit. Gelegentlich zu Behandlungsbeginn Kopfschmerzen, die im weiteren Verlauf meist abklingen. Evtl. kann eine individuelle Dosisanpassung diese Nebenwirkungen vermindern od. beseitigen. Unter der Therapie kann es zu Blutdruckabfall bis hin zum Kollaps u. Schock kommen. Hypertone Ausgangswerte sprechen deutlicher auf Molsidomin an als normotone od. hypotone. Das Reaktionsvermögen kann sich auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch soweit verändern, daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr od. zum Bedienen v. Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere b. Behandlungsbeginn u. im Zusammenwirken mit Alkohol. Allergische Hautreaktionen. In Tierversuchen hat Molsidomin in hohen Dosen Krebs hervorgerufen. Solange die Übertragbarkeit dieser Befunde auf den Menschen nicht aufgeklärt ist, bleibt ein Verdacht krebserregender Wirkungen bestehen. **Wechselw.:** Die gleichzeitige Einnahme v. Vasodilatoren, Calciumantagonisten, Antihypertensiva u. Alkohol kann die blutdrucksenkende Wirkung v. duracoron[®] 1/2/4 verstärken. **Hinw.:** duracoron[®] 1/2/4 ist nicht geeignet zur Kupierung des akuten Angina pectoris-Anfalls. **Dos.:** Je nach Schweregrad der Erkrankung 2-3 x tgl. 1 Tbl. duracoron[®] 1 bzw. 2 oder 2-4 x tgl. 1 Tbl. duracoron[®] 4 mit ausreichend Flüssigkeit möglichst nach dem Essen. **Handelsformen und Preise:** duracoron[®] 1: 30 Tbl. (N1) DM 11,95, 50 Tbl. (N2) DM 18,80, 100 Tbl. (N3) DM 33,00; duracoron[®] 2: 30 Tbl. (N1) DM 15,95, 50 Tbl. (N2) DM 23,50, 100 Tbl. (N3) DM 41,35; duracoron[®] 4: 30 Tbl. (N1) DM 20,10, 50 Tbl. (N2) DM 29,85, 100 Tbl. (N3) DM 54,25. **Weitere Angaben** finden Sie in den wissenschaftlichen Unterlagen bzw. Packungsbeilagen. Stand: Feb. 87 durachemie GmbH & Co. KG.

Mit duracoron behandeln Sie die Angina pectoris, wenn Ihnen auch der Preis am Herzen liegt.

Für die Langzeittherapie verordnen Sie:
duracoron[®] 1 (N3) 100 Tbl. DM 33,--
duracoron[®] 2 (N3) 100 Tbl. DM 41,35
duracoron[®] 4 (N3) 100 Tbl. DM 54,25

Bürgermeister-Seidl-Str. 7, 8190 Wolfratshausen. Qualität im Sinne des Erfinders. Zu Preisen im Zeichen der Zeit.

durachemie