

## Ernest Hemingway

Als sich am 2. Juli 1961 Ernest Hemingway in seinem Haus in Sun Valley, Idaho, das Leben nahm, starb auch




Foto: Archiv

sein Mythos. Sein Engagement auf Seiten der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, seine Leidenschaft für Stierkämpfe, Großwildjagd und Sport-

fischerei hatten ihn schon zu Lebzeiten zu einer Legende gemacht. 25 Jahre nach seinem Tod sind die BBC und der NDR in einer Co-Produktion den Spuren Hemingways nachgegangen. Aus Interviews mit Familienangehörigen, Freunden und Biographen entstand das Porträt eines Mannes, dessen Romane und Kurzgeschichten zu den großen Werken der Weltliteratur zählen. Der Film folgt den Schauplätzen seines Lebens in Amerika, Italien, Paris, Spanien, Afrika und in der Karibik. Das **Dritte Fernsehen Südwest** zeigt den ersten Teil dieses Films am Pfingstsonntag, **7. Juni, um 21.50 Uhr**; er schildert Hemingways Jugend, seine Schulzeit und seine ersten Erfolge als Journalist in Kansas City. Außerdem wird über Hemingways Erlebnisse und

seine Verwundung als amerikanischer Freiwilliger an der Isonzo-Front im Ersten Weltkrieg berichtet. Weitere Sendetermine: 8. Juni, 22.35 Uhr; 17. Juni, 22.15 Uhr; 18. Juni, 22.30 Uhr.

## Medizinsendungen

**Die Sprechstunde.** AIDS-Risikogruppe Prostituierte. **Drittes Fernsehen Nord, 5. Juni, 18.30 Uhr.**

**Schauplatz Deutschland.** „Noch leb' ich ja.“ Ein AIDS-Kranker erzählt. Video von Michael Aue. **Drittes Fernsehen Hessen, 5. Juni, 20.00 Uhr.**

**Hormone: Botschafter des Lebens.** Bericht über Kommunikation zwischen Körper und Gehirn. **Drittes**

**Fernsehen Hessen, 5. Juni, 20.45 Uhr.**


**Wissenschaft im Gespräch.** Wie prägend ist die frühe Kindheit? Neuere Einsichten zur Bedeutung der Mutterbindung, vorgestellt von Lajos Schöne. **Süddeutscher Rundfunk, 2. Programm, 6. Juni, 17 Uhr.**

**Leben im Alter.** Kompanie des guten Willens. **Drittes Fernsehen West, 7. Juni, 18.30 Uhr.**

**Weltkongress für Dermatologie.** Bericht aus Berlin. **Deutschlandfunk, 8. Juni, 21.30 Uhr.**

**Kinder sprechen über den Tod.** Aus der Reihe „Situation: Wir und die Kinder“. **Drittes Fernsehen Bayern, 9. Juni, 18.15 Uhr.**

**Die Sprechstunde.** Wenn die Gelenke schmerzen: Arthrose. **Drittes Fernsehen Bayern, 9. Juni, 20.45 Uhr.**



Dieses Zeichen steht für die preiswerte Markenqualität, die Ihnen durachemie bietet.

# dura- nifin

## Hypertonie: Nifedipin

Wir haben unser Herz-Kreislaufpräparat duranifin galenisch optimiert. Und preislich auch. **duranifin® retard (N3) 100 Tbl. 20 mg DM 49,40**

**duranifin® 5, duranifin® 10, duranifin® retard, duranifin® 40 retard:** Zus.: 1 Kps. enthält Nifedipin 5 mg bzw. 10 mg, 1 Retardtbl. enthält Nifedipin 20 mg bzw. 40 mg. **Anwend.:** 1. Zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit – Chronisch stabile Angina pectoris (Belastungsangina) – Ruheangina einschl. der vasospastischen Angina pectoris (Prinzmetal-Angina) sowie der instabilen Angina (Crescendo-Präinfarkt-Angina) – Angina pectoris nach Herzinfarkt. 2. Zur Behandl. des Bluthochdrucks (Hypertonie) mit duranifin 10 und retard. **Gegenanz.:** Herz-Kreislauf-Schock, Schwangerschaft. **Nebenw.:** Beginn der Behandl.: Es kann zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush) und Wärmegefühl kommen. In Einzelfällen kann bei höherer Dosierung Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Hautreaktionen und Kribbeln in Armen und Beinen (Parästhesie), Blutdrucksenkung unter die Norm (hypotonie Reaktion), Herzklopfen (Palpitationen) und Erhöhung der Pulsfrequenz beobachtet werden. **Dos.:** Es gelten folgende Dosierungsrichtlinien: Erw.: 1. Bei koronarer Herzkrankheit, chronisch stabile Angina – Angina pectoris (Belastungsangina) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Ruheangina (vasospastische Angina pectoris) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Prinzmetal-Angina (Variant-Angina) und instabile Angina (Crescendo-Präinfarkt-Angina) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Angina pectoris nach Herzinfarkt 3 mal 1-2 Kps./Tbl. Falls höhere Dosierungen notwendig sind, ist eine Erhöhung der Tagesdosis auf 4 mal 2 bis 6 Kps. möglich. 2. Bei Bluthochdruck (Hypertonie) mit duranifin 10 und retard: 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl., 40 retard: 2 mal 1 Tbl. tägl. **Art der Anwend.:** Zwischen den empfohlenen Einzeldosen von 20 mg soll der Einnahmeabstand 2 Std. nicht unterschreiten. **Handelsformen und Preise:** duranifin® 5: 25 Kps. (N1) DM 7,-, 50 Kps. (N2) DM 12,-, 100 Kps. (N3) DM 21,-; duranifin® 10: 30 Kps. (N1) DM 13,-, 50 Kps. (N2) DM 20,-, 100 Kps. (N3) DM 36,-; duranifin® retard: 30 Tbl. (N1) DM 17,50, 50 Tbl. (N2) DM 27,75, 100 Tbl. (N3) DM 49,40; duranifin® 40 retard: 20 Tbl. (N1) DM 23,50, 50 Tbl. (N2) DM 49,60, 100 Tbl. (N3) DM 87,70. **Weitere Angaben** finden Sie in den wissenschaftlichen Unterlagen bzw. Packungsbeilagen. Stand: März 87 durachemie GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Str. 7, 8190 Wolfratshausen. **Qualität im Sinne des Erfinders. Zu Preisen im Zeichen der Zeit.**

**durachemie**