

hen Bayern, 9. Dezember, 17.30 Uhr.

Der schwere Weg ins Leben wird leichter. Von den Fortschritten der Geburtshilfe. Von Margit Schmidt-Kolb und Dieter Schwab. **Bayerischer Rundfunk, 2. Programm, 9. Dezember, 19.30 Uhr.**

Featureabteilung. Testen, melden und dann absondern? Eine Krankheit verändert unsere Gesellschaft. Originaltonbericht von Beate Schubert. **Sender Freies Berlin, 3. Programm, 10. Dezember, 20.15 Uhr.**

Argumente. Wenn Spielen zur Sucht wird. Bericht von Heinz Rohde. Redaktion: Hans-E. Pries. **Drittes Fernsehen Nord, 10. Dezember, 22.25 Uhr.** Vorgestellt werden u. a. einige neue Spielgeräte, die auch zu einer neuen Gefahr werden können.

Selbstmedikation ist im Kommen

Die Selbstmedikation und „Gesundheitstests“ in den eigenen vier Wänden sind auch hierzulande im Kommen. In den USA ist das „Hometesting“ bereits groß in Mode. Allein 1986 gaben die US-Bürger für Krankheits-/Gesundheitstests über eine Milliarde Dollar aus (Feststellung von Zahnplaques-Befall, Allergie-, Schwangerschafts-Tests, Laien-Diagnose durch Muskelbelastung u. a.).

„**Blickpunkt Gesundheit**“ informiert im **Dritten Fernsehen West** am **6. Dezember um 18.30 Uhr** über die Facetten dieses Modetrends und die Problematik der Selbstmedikation. Hierzulande




Selbstmedikation und Gesundheitstests – ein Modetrend aus USA. Nützen sie immer dem Patienten? Foto: Center Press

wird sie als willkommener Schritt zur „Kostendämpfung“ und zu mehr Selbstverantwortung propagiert. Nur: Wer meint, sich ohne ärztliche Konsultationen selbst kurieren zu können, greift oftmals zu teuren, aber kaum wirksamen Mitteln, oder aber – und das wäre gesundheitspolitisch bedenklich – Selbstkurieren nach der Art des Dr. Eisenbarth käme die Krankenkassen teuer zu stehen.

TV-SAT 1 im All

Um 3.19 Uhr (MEZ) hob in der Nacht des 21. November die 49 Meter hohe und 220 Tonnen schwere Ariane-2-Rakete vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana ab. An Bord hatte sie den direktstrahlenden Fernseh- und Rundfunksatelliten TV-SAT 1, mit dem es ab Frühjahr 1988 möglich sein soll, europaweit vier Fernseh- und 16 digitale Hörfunkprogramme zu empfangen. Nach dem Start stieß Ariane die drei Brennstufen und die Verkleidung ab. Aber: Einer der beiden Sonnengeneratoren, die sich entfalten sollten, blieb zunächst eingeklappt. Zur Zeit ist es noch ungewiß, ob der Satellit mit voller Kraft arbeiten wird. □



Dieses Zeichen steht für die preiswerte Markenqualität, die Ihnen durachemie bietet.

dura-

nifin®

Hypertonie: Nifedipin

Wir haben unser Herz-Kreislaufpräparat duranifin[®] galenisch optimiert. Und preislich auch. **duranifin[®] retard (N3) 100 Tbl. DM 49,40**

duranifin[®] 5, duranifin[®] 10, duranifin[®] retard, duranifin[®] 40 retard; Zus.: 1 Kps. enthält Nifedipin 5 mg bzw. 10 mg, 1 Retardt. enthält Nifedipin 20 mg bzw. 40 mg. **Anwend.:** 1. Zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit – Chronisch stabile Angina pectoris (Belastungsangina) – Ruheangina einschl. der vasospastischen Angina pectoris (Prinzmetal-Angina) sowie der instabilen Angina (Crescendo-Präinfarkt-Angina) – Angina pectoris nach Herzinfarkt. 2. Zur Behandl. des Bluthochdrucks (Hypertonie) mit duranifin 10 und retard. **Gegenanz.:** Herz-Kreislauf-Schock, Schwangerschaft. **Nebenw.:** Beginn der Behandl.: Es kann zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush) und Wärmegefühl kommen. In Einzelfällen kann bei höherer Dosierung Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Hautreaktionen und Kribbeln in Armen und Beinen (Parästhesie), Blutdrucksenkung unter die Norm (hypotone Reaktion), Herzklopfen (Palpitationen) und Erhöhung der Pulsfrequenz beobachtet werden. **Dos.:** Es gelten folgende Dosierungsrichtlinien: Erw.: 1. Bei koronarer Herzkrankheit, chronisch stabile Angina – Angina pectoris (Belastungsangina) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Ruheangina (vasospastische Angina pectoris) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Prinzmetal-Angina (Variant-Angina) und instabile Angina (Crescendo-Präinfarkt-Angina) 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl. – Angina pectoris nach Herzinfarkt 3 mal 1-2 Kps./Tbl.. Falls höhere Dosierungen notwendig sind, ist eine Erhöhung der Tagesdosis auf 4 mal 2 bis 6 Kps. möglich. 2. Bei Bluthochdruck (Hypertonie) mit duranifin 10 und retard: 3 mal tägl. 1-2 Kps./Tbl., 40 retard: 2 mal 1 Tbl. tägl. **Art der Anwend.:** Zwischen den empfohlenen Einzeldosen von 20 mg soll der Einnahmeabstand 2 Std. nicht unterschreiten. **Handelsformen und Preise:** duranifin[®] 5: 25 Kps. (N1) DM 7,-, 50 Kps. (N2) DM 12,-, 100 Kps. (N3) DM 21,-; duranifin[®] 10: 30 Kps. (N1) DM 13,-, 50 Kps. (N2) DM 20,-, 100 Kps. (N3) DM 36,-; duranifin[®] retard: 30 Tbl. (N1) DM 17,50, 50 Tbl. (N2) DM 27,75, 100 Tbl. (N3) DM 49,40; duranifin[®] 40 retard: 20 Tbl. (N1) DM 23,50, 50 Tbl. (N2) DM 49,60, 100 Tbl. (N3) DM 87,70. **Weitere Angaben** finden Sie in den wissenschaftlichen Unterlagen bzw. Packungsbeilagen. Stand: März 87. **durachemie GmbH & Co. KG.** Bürgermeister-Seidl-Str. 7, 8190 Wolfratshausen. **Qualität im Sinne des Erfinders. Zu Preisen im Zeichen der Zeit.**

durachemie