

Hypertonie

Von D. G. Beevers und G. A. MacGregor
Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von
R. Heister

1988, 240 Seiten, zahlreiche, teils farbige
Abbildungen, Tabellen, gebunden,
DM 79,— ISBN 3-7691-0157-X

Welchen Arzt in der Praxis packt nicht manchmal
der schiere Frust angesichts all der Herkulesarbeit
mit den Hochdruckpatienten? In solchen Phasen
ist es oft sinnvoll, die Umstände der täglichen
Routine einmal Revue passieren zu lassen.

Das klar, praxisnah und eingängig geschriebene
Hypertonie-Buch der beiden englischen Autoren
Beevers und MacGregor ist für den beruflich stark
belasteten Arzt in der Praxis ein hilfreicher Weg-
weiser durch das Dickicht „Hypertonie“. Die Au-
toren verknüpfen Bekanntes und weniger Bekann-
tes zu Einblicken, die den täglichen Kleinkram
überragen und ordnen.

Das Buch „Hypertonie“ von Beevers und Mac-
Gregor hilft dem Arzt in der Praxis, die „Volks-
krankheit Bluthochdruck“ wieder mit mehr Gelas-
senheit und Erfolg anzugehen.



Deutscher Ärzte-Verlag

Postfach 400265 · 5000 Köln 40
Telefon (02234) 7011-316

Bestellcoupon

Ja, ich bestelle aus dem Deutschen Ärzte-Verlag,
Postfach 400265, 5000 Köln 40, durch die Buchhandlung

DÄ A-42/88

Expl. **Beevers, Hypertonie** je DM 79,—

Name, Vorname

PLZ, Ort

Straße

Datum, Unterschrift

Irrtümer und Preisänderung vorbehalten.

Acarbose in der Diabetes-Therapie

„Diabetes mellitus in der
Praxis – Alpha-Glucosidase-
Inhibitoren in der Therapie“,
ein neuer Film der Bayer
AG, wurde unter der wissen-
schaftlichen Beratung von
Prof. Pierre Lefèbvre, Bel-
gien, erarbeitet.

Er befaßt sich unter ande-
rem mit den Problemfällen
des Erwachsenen-Diabetes,
bei denen, wie dargestellt
wird, in den meisten Fällen
die Gabe von Alpha-Glucosi-
dase-Inhibitoren wie Acarbose
die Blutzucker-Werte regu-
liert. Diese Substanzen
hemmen die rasche Resorp-
tion der Kohlenhydrate im
Darm. Postprandiale Blut-
zuckerspitzen treten damit
nicht mehr auf. Die Gabe
von Alpha-Glucosidase-
Hemmern erfordert eine
Neueinstellung der Insulin-
Dosen, damit der Patient
nicht hypoglykämisch wird.
Ganz besonders herausge-
stellt wird in diesem Lehrfilm
die Wichtigkeit der Selbst-
kontrolle des Patienten mit-
tels Teststreifen, Reflekt-
ometrie und Tagebuch.

Der 25minütige 16-mm-
Video-Film kann bei der
Bayer AG, AW-WE AVI,
Geb. Q 26, 5090 Leverkusen-
Bayerwerk, Tel. 02 14/
30 86 71, ausgeliehen wer-
den. Lz

Ulkustherapie vom pH-Wert unabhängig

In verschiedenen klini-
schen und experimentellen
Studien zeigte sich, daß der
Wirkstoff Sucralfat (Ulco-
gant®, E. Merck) unabhängig
vom pH-Wert im Magen
wirkt. Wie die Merck-Press-
stelle mitteilte, wurde belegt,
daß dieses lokal, nicht sy-
stemisch wirkende Ulkusthe-
rapeutikum seine protektive
Wirkung auch bei höheren
pH-Werten entfaltet. Der
Wirkmechanismus ist ebenso
nach Einnahme von säure-

bindenden oder magensäure-
hemmenden Mitteln gewähr-
leistet. Selbst eine Reduzie-
rung der Säurefreisetzung um
60 Prozent beeinträchtigt
nicht die Anhaftung von
Sucralfat an den Läsionen.

Eine im American Journal
of Medicine veröffentlichte
Studie von Booth J. Z. Da-
nesh, Gastroenterologische
Abteilung des Royal Infirmary
Glasgow, United King-
dom, bestätigt diese Befun-
de. Bei einer Untersuchung
von Azetylsalicylsäure-
beziehungsweise Gallensäure-
induzierten Läsionen kam
Danesh zu dem Ergebnis,
daß Sucralfat Anzahl und
Schwere der Läsionen sowohl
bei niedrigem als auch bei ho-
hem pH-Wert signifikant re-
duziert. Beim pH-Wert 6,5
war die Behandlung sogar er-
folgreicher. PM

Kurz informiert

**Mono Maycor® von Gö-
decke** – Neben den bewähr-
ten Isosorbiddinitraten Ma-
ycor® 5/20 und Maycor® re-
tard 20/40/60 bietet die Gö-
decke Gruppe, Freiburg, nun
auch ein Mono-Nitrat-Präpa-
rat an. Mono Maycor® 20
und Mono Maycor® 40 ent-
halten 20 beziehungsweise 40
mg Isosorbid-5-nitrat zur
Dauerbehandlung der KHK
und Prophylaxe von Angina-
pectoris-Anfällen. Die abso-
lute Bioverfügbarkeit von
oral verabreichtem Mono
Maycor® liegt bei hundert
Prozent, wie der Hersteller
betont. Das Präparat steht in
Packungen mit 20, 50 und 100
Tabletten zur Verfügung. pe

**Theophyllin von Byk Gul-
den einmal abends** – Mit Eu-
phylong® und Euphylong®
minor stellt das Pharmaun-
ternehmen Byk Gulden,
Konstanz, ein Theophyllin-
Präparat mit neu entwickel-
ter Galenik zur Verfügung,
das die Einmalgabe einer Re-
tardkapsel am Abend er-
laubt. Die Euphylong® Re-
tardkapsel enthält 375 mg
Theophyllin H₂O-frei, dieje-
nige von Euphylong® minor
250 mg. pe