

Medizin und Wissenschaft

Die Sprechstunde. „Mach Platz“. Konflikte im Straßenverkehr. **Drittes Fernsehen Nord, 12. Februar, 18.30 Uhr.**

Seele und Computer. Intelligente Programme für Psychotherapie und Psychotests. Buch und Regie: H. G. Helms; Redaktion: Peter Meimeth. **Drittes Fernsehen West, 13. Februar, 17 Uhr.**

IRK – Chiffre für Menschlichkeit. 125 Jahre Rotes Kreuz. Eine Sendung von Dieter Mayer-Simeth. **Bayrischer Rundfunk, 14. Februar, 20 Uhr.**

Das Wissenschaftsmagazin. Freiwillig aus dem Leben? **Studiowelle Saar, 15. Februar, 20.30 Uhr.**

Mitleid hilft hier keinem. Portrait einer Lehrerin für taubblinde Kinder. Redaktion: Elke Hockerts-Werner. **Drittes Fernsehen West, 15. Februar, 20.30 Uhr.**

Die Sprechstunde. Abnehmen durch Hypnose? **Drittes Fernsehen Nord, 19. Februar, 18.30 Uhr.**

Kinder im Krankenhaus

Die neueste Folge der Sendereihe „**Gesundheitstreff**“ im **Dritten Fernsehen Südwest (12. Februar, 19.30 Uhr)** stellt Elterninitiativen vor, so das Aktionskomitee „**Kind im Krankenhaus**“, vor 20 Jahren gegründet. Die „**Berliner Herzlinge**“ nennt




Einen „therapeutischen Effekt“ kann die Betreuung von Kleinkindern im Krankenhaus durch deren Mütter bewirken. Foto: Archiv

sich eine im ganzen Bundesgebiet aktive Selbsthilfegruppe, in der sich Eltern von herzkranken Kindern zusammengeschlossen haben. Experte Dr. Gerhard Rupprath,

Kinderklinik Kaiserslautern, diskutiert mit den Betroffenen und stellt eine Behandlungsmethode vor, die bei bestimmten angeborenen Herzfehlern Operationen ersetzt.

Gezielte
Magnesium-Therapie



Magnesiocard®

Zusammensetzung: 1 Kapsel/1 lackierte Tablette/1 Amp. i. m. zu 5 ml enthalten: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid-trihydrat 614,8 mg, Magnesiumgehalt: 2,5 mmol = 60,78 mg. 1 Ampulle i. v. zu 10 ml enthält: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid-trihydrat 737,6 mg. Magnesiumgehalt: 3 mmol = 72,94 mg. 5 g Granulat zum Trinken (1 Beutel) enthalten: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid-trihydrat 1229,6 mg. Magnesiumgehalt: 5 mmol = 121,56 mg. Verdauliche Kohlenhydrate 3,1 g. **Indikationen:** Zur Behandlung des primären und sekundären Magnesium-Mangel-Syndroms, besonders zur Prophylaxe und Therapie der durch Magnesiummangel und Streß bedingten Herzerkrankungen. Bei Magnesium-Mangelzuständen, zum Beispiel infolge Fastenkuren, Hypercholesterinämie, Arteriosklerose, Leberzirrhose, Pankreatitis, Schwangerschaft, Stillzeit, Einnahme östrogenhaltiger Kontrazeptiva, zur Calciumoxalatstein-Prophylaxe. **Kontraindikationen:** Exsikkose, Niereninsuffizienz mit Anurie, Calcium-Magnesium-Ammoniumphosphatsteine. **Magnesiocard** Ampullen sollen nicht angewandt werden bei AV-Block, Myasthenia gravis. Die Injektion von Magnesiocard bei gleichzeitiger Herzglykosid-Therapie ist nur in Fällen von Tachykardie bzw. Tachyarrhythmie angezeigt. **Nebenwirkungen:** Ampullen: Bradykardie, Überleitungsstörungen, periphere Gefäßerweiterungen. **Handelsformen und Preise:** 25 Kps. DM 10,34, 50 Kps. DM 19,72, 100 Kps. DM 35,51. 25 Tbl. DM 10,09, 50 Tbl. DM 19,37, 100 Tbl. DM 34,70. 20 Btl. DM 13,46, 50 Btl. DM 30,02, 100 Btl. DM 50,39. 2 Amp. i. m. DM 3,89, 5 Amp. i. m. DM 8,68. 3 Amp. i. v. DM 6,91, 10 Amp. i. v. DM 20,63.

Verla-Pharm, Arzneimittelfabrik, 8132 Tutzing

Für den
Risikopatienten

Streßabschirmung
Calcium-Antagonismus

