

## Championate der Surfer am Gardasee

Die 10. Windsurfing-Europameisterschaften für Ärzte- und Apotheker finden vom 8. bis 15. September 1990 in Verbindung mit dem 3. Internationalen Sportmedizin-Symposium Windsurfen in Torbole am Gardasee/Italien statt.

Medizinische Theorie und sportliche Praxis zusammenzufassen, ist das Ziel der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Sportärzterverband e. V. durchgeführt wird und die für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ anerkannt ist.

Die Wettfahrten werden als Funboard-Kurs/A.R.T.-Fanatic-Cup und als Euro-Funboard-Kurs/dura-Cup durchgeführt.

Daneben werden eine Surfschule und geführte Mountainbike-Touren angeboten, so daß auch Freizeitsportler und „Einsteiger“ angesprochen werden.

Interessenten für Teilnahme und Unterkunft wenden sich an Dr. med. Reinhard Schneiderhan, Grundstraße 1, 7420 Münsingen. Telefonische Rückfragen bei Dr. med. Rolf Palm: 0 91 72/9 21.

Der Windsurfing Europacup für Mediziner und Pharmazeuten („Euro '90“), findet vom 23. bis zum 30. September 1990 in Malcesine am Gardasee statt.

Gleichzeitig läuft auch ein Sportmedizin Symposium zum Thema „Gesundheitsgefährdung beim Wassersport“. Auch die Teilnahme an die-

sem Symposium wird für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ anerkannt.

Die Regatten für Mediziner werden – abhängig von der Teilnehmerzahl – in Altersklassen gestartet. Pharmazeuten, Studenten, medizi-

nisches Personal und Gäste erhalten eigene Wertungen. Für Einsteiger werden Surf-kurse angeboten.

Anmeldung: Dr. med. Björn Clasen, Klinikum rechts der Isar, Ismaningerstraße 22, 8000 München 80, Telefon: 0 89/41 40-23 89. EB

## Neues Angebot: „Ferien-Residenz“

Zusätzlich zur Aktie oder zum Urlaub-Wohnplan kann man ab Anfang nächsten Jahres bei dem Schweizerischen Touristikunternehmen Hapimag in ein neuartiges Arrangement einsteigen, die „Hapimag-Ferien-Residenz“. Hier kann der Urlauber eine bestimmte Ferienwohnung an einem von 39 Standorten in Europa oder den USA für die nächsten zehn oder zwanzig

Jahre in einer jeweils fest vereinbarten Woche des Jahres buchen. Sollte man dann aber keinen Gebrauch von dieser Buchung machen wollen, so kann man ohne Aufpreis innerhalb des Reservierungssystems tauschen. Für diese Möglichkeit stellt Hapimag zehn Prozent seiner vorhandenen Ferienanlagen (Wohnungsbestand: 2300 Einheiten) zur Verfügung. WZ

4

Rentschler

Der Rat

RAT  
UND  
TAT

Die Tat

Rentschler  
Diagnosehilfen

Algorithmen zur Diagnose und Therapie  
der häufigsten kardiovaskulären  
Erkrankungen: Kardiologie, Angiologie,  
Endokrinologie und Dermatologie

Eine neue und  
umfassende  
Diagnose- und  
Therapiehilfe –  
exklusiv von  
Rentschler



Die ganze  
Spannweite  
der Nifedipin-  
Therapie –  
immer unter  
Festbetrag

**Aprical<sup>®</sup> 10 Kapseln, Aprical<sup>®</sup> Lösung** **Zusammensetzung:** Aprical<sup>®</sup> 10: 1 Kapsel enthält 10 mg Nifedipin; Aprical<sup>®</sup> Lösung: 1 Flasche (30 ml) enthält 600 mg Nifedipin. **Indikationen:** Chronisch stabile Angina pectoris, Ruheangina inklusive vasospastische Angina pectoris (Prinzmetal-, Variant-Angina), instabile Angina, Angina pectoris nach Herzinfarkt bei stabilisiertem Kreislauf (außer innerhalb 8 Tagen nach akutem Myokardinfarkt); Aprical<sup>®</sup> 10 zusätzlich: Hypertonie, Morbus Raynaud; Aprical<sup>®</sup> Lösung zusätzlich: Hypertensive Krise, Morbus Raynaud. **Kontraindikationen:** Herz-Kreislauf-Schock, schwere Hypotonie (weniger als 90 mm Hg syst.) und gesamte Schwangerschaft. In der Stillzeit sollte bei regelmäßiger Anwendung von Aprical<sup>®</sup> 10/Aprical<sup>®</sup> Lösung baldmöglichst abgestellt werden, da Nifedipin in die Muttermilch übergehen kann. **Nebenwirkungen:** Vereinzelt und meist initial: Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Flush, Wärmegefühl, Magendruck, Übelkeit, Erbrechen, Parästhesien, Hypotonie, Tachykardien. Gelegentlich Beinödeme. Selten Palpitationen und Exantheme. Außerst selten nach Dauertherapie reversible Gingivahyperplasie. Bei Dialysepatienten mit maligner Hypertonie und irreversiblen Nierenversagen mit Hypovolämie Vorsicht, da deutlicher Blutdruckabfall möglich. Sehr vereinzelt wurden Überleitungsstörungen und dekompensierte Herzinsuffizienz beobachtet; Therapie absetzen. Außerst selten 15-30 Minuten p. appl. präkordiale Schmerzen; Therapie absetzen, falls ein Kausalzusammenhang vermutet wird. Einschränkung des Reaktionsvermögens, insbesondere gleichzeitig mit Alkohol möglich. In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Vergrößerung der männlichen Brust (Gynäkomastie) kommen. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Mit Vasodilatoren, Antihypertensiva und Cimetidin verstärkter Blutdruckabfall. Wird Aprical<sup>®</sup> 10/Lösung mit  $\beta$ -Blockern verabreicht, wegen Hypotension den Patienten überwachen; gelegentlich wurde auch über Herzinsuffizienz berichtet. **Aufbewahrungshinweis:** Vor Licht geschützt aufbewahren! **Handelsformen und Preise:** Aprical<sup>®</sup> 10: OP mit 30 Kapseln (N1) DM 11,30, OP mit 50 Kapseln (N2) DM 18,-, OP mit 100 Kapseln (N3) DM 33,25; Aprical<sup>®</sup> Lösung: OP mit 30 ml DM 17,80, OP mit 60 ml (2x30) DM 29,80, OP mit 90 ml (3x30) DM 43,95; Anstaltspackungen. Weitere Handelsformen: Aprical<sup>®</sup> 5, Aprical<sup>®</sup> 20, Aprical<sup>®</sup> retard. (Stand 6/1990)

Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH & Co., 7958 Laupheim.